

もっと安心農産物 枝豆 栽培暦 平成30年

J A ちば東葛 旭出荷組合

1. 土づくり

完熟堆肥を施用する (前作物で施用する)

2. 施肥 ☆施肥診断にもとづく施肥量の遵守

	肥料名	施肥量	
基肥	枝豆君505 (5-10-5)	120K g / 10 a 以下	
	または		
	落花生化成 (5-15-20)	50K g / 10 a 以下	
追肥			

2. 防除

春蒔き

月	管理作業	薬剤名	希釈倍数・処理量	対象病害虫	備考(耕種的防除の実施等)	
2月上旬	播種	トレボン乳剤	1,000 倍 (14 日前・2 回)	カメムシ類 マメシクイガ	センチウ発生の場合は、前作ホウレンソウ作付け前に土壌消毒を実施する	
中旬		↓	トレボンMC	1,000 倍 (14 日前・2 回)		カメムシ類 マメシクイガ
下旬			アグロスリン乳剤	2,000 倍 (7 日前・3 回)		カメムシ類 マメシクイガ
3月上旬	定植	スタークル顆粒水和剤	2,000 倍 (7 日前・2 回)	カメムシ類	害虫防除のため、圃場周辺の雑草を除去する	
中旬		↓	ダニトロンフロアブル	1,000 倍 (7 日前・1 回)		ハダニ類 チャノホリダニ
下旬			ダントツ水溶剤	2,000 倍 (3 日前・3 回)		カメムシ類 アブラムシ
4月上旬	収穫	アフアーム乳剤	2,000 倍 (3 日前・2 回)	ハスモンヨトウ		
中旬			フェニックス顆粒水和剤	2,000 倍 (前日・3 回)		ハスモンヨトウ
下旬			アドマイヤー1 粒剤	3 k g / 10a		アブラムシ類
5月上旬	↓	ダイアジノン粒剤 5	4 k g / 10a	ネリムシ類		
中旬			プレバ`ンフロアブル 5	4,000 倍 (3 日前・3 回)		ヨトウ マメシクイガ
下旬			ランマンフロアブル	1,000 倍 (3 日前・1 回)		ハト
6月上旬		トリアサイト`粒剤	4kg/10a	一年生雑草		
中旬						
下旬						

秋蒔き

月	管理作業	薬剤名	希釈倍数・処理量	対象病虫害	備考(耕種的防除の実施等)	
8月上旬	播種	トレボン乳剤	1,000倍 (14日前・2回)	カメムシ類 マメシクイガ	害虫防除のため、圃場周辺の雑草を除去する	
中旬	定植	トレボンMC	1,000倍 (14日前・2回)	カメムシ類 マメシクイガ		
下旬	↓	アグロスリン乳剤	2,000倍 (7日前・3回)	カメムシ類 マメシクイガ		
9月上旬	収穫	スタークル顆粒水和剤	2,000倍 (7日前・2回)	カメムシ類		
中旬		ダニトロンフロアブル	1,000倍 (7日前・1回)	ハダニ類 チャノホリダニ		
下旬		ダントツ水溶剤	2,000倍 (3日前・3回)	カメムシ類 アブラムシ		
10月上旬		アファーム乳剤	2,000倍 (3日前・2回)	ハスモンヨトウ		
中旬		↓	フェニックス顆粒水和剤	2,000倍 (前日・3回)		ハスモンヨトウ
下旬		アドマイヤー1粒剤	3kg/10a	アブラムシ類		
11月上旬		ダイアジノン粒剤5	4kg/10a	ネキリムシ類		
中旬		プレバソフロアブル5	4,000倍 (3日前・3回)	ヨトウ マメシクイガ		
下旬		ランマンフロアブル	1,000倍 (3日前・1回)	ベト		
			トリアノサイト粒剤	4kg/10a		一年生雑草

☆みんなで守ろう生産基準